



# 鑑別診断

	片頭痛	群発頭痛
性差	女性に多い (3~4:1) 女性の場合月経前後に 起こる事が多い。	男性に多い。(5:1の割合) 男性でも特に20~40代 に多い。
頭痛の頻度	1/M~2/W	1/2D~8/D ほぼ毎日
頭痛の持続時間	4~7 2時間まで	15分~3時間まで
部位	<p>多くは片側 (4割で両側)</p>  <p>肩こり・頸こりを伴う ことが多い。</p>	<p>必ず片側・目の奥</p>  <p>一側の目の奥の激痛 (3大激痛の一つ) 「目をえぐられるような」 「目に火箸を突込まれるような」</p>
前兆	2割にあり。1時間以内。 閃輝暗点 光・音・臭い過敏 シビレ・構音障害・ めまい、allodyniaなど	予兆は少ないが 目の奥が疼く、 おでこが発赤する、 頭の絞扼感がある。 などの症状がある場合がある。
痛み以外の特徴	運動で増悪する。	頭痛側の涙・鼻水・目の充血・ 眼裂狭小・縮瞳・顔の紅潮 を伴う。
痛みの程度	動くと痛みが悪化する。 じっとしている。	動くと痛みがまぎれる。 じっとしていられない。 頭を抱えて転げまわる。
	仕事は休まない。	仕事を休む。
ポイント	<p>(1)50歳以上の頭痛、 前兆1時間以上、 頭痛72時間以上、 は片頭痛ではない。</p> <p>(2)①動作による増悪 ②悪心 ③光過敏 ④臭い敏感 のうち2項目以上陽性で、 片頭痛の可能性が高い。</p>	